




ПРОГРАМА ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ВАКЦИНАЦІЇ ПРОТИ ВІРУСУ ПАПЛОМИ ЛЮДИНИ (ВПЧ) У МІСТІ КАТОВІЩЕ





Що таке ВПЛ?

- Це вірус папіломи людини, який характеризується високою заразністю як у жінок, так і у чоловіків
- Відомо понад 200 типів вірусу.
- ВПЛ не здатний функціонувати самостійно, переважно проникаючи в клітини епідермісу та слизових оболонок.
- Більшість інфекцій проходить спонтанно, але в 0,8 % інфікованих клітин він викликає рак.



źródło: google.com


Чим ВПЛ небезпечний для людини?

- ВПЛ - це поширений вірус, що вражає як чоловіків, так і жінок.

- Він відповідає за утворення бородавок, уражень шкіри, відомих як кондиломи, і злоякісних пухлин.

- За оцінками, кількість жінок і чоловіків, які є носіями ВПЛ у світі, становить 660 мільйонів.

- Це фактор, який щороку спричиняє 595 000 випадків раку.





źródło:Google.com

Чим ВПЛ небезпечний для людини?

Типи ВПЛ, що викликають генітальні інфекції, класифікуються як високого або низького ризику.

Типи високого ризику можуть призвести до розвитку раку.

Дослідження пов'язують 99,7 % випадків раку шийки матки з інфікуванням онкогенними типами ВПЛ 16 і 18, причому типи 16 і 18 викликають до 70 % інфекцій, що призводять до ракових уражень.

Щорічно в Польщі реєструється приблизно 3 200 нових випадків раку шийки матки.


Щороку 1 700 польських жінок помирає з цієї причини.

Чи ВПЛ вражає лише жінок?

У контексті проблеми, проблема

до цього часу, 4 з 10 випадків
захворювання на ВПЛ спостерігаються у
жінок.

Чоловіки можуть бути носіями ВПЛ.



źródło: google.com





Як можна інфікуватися ВПЛ?



źródło: google.com

Єдиним джерелом інфекції є чоловік, і інфекція передається статевим шляхом.

Інші шляхи зараження можливі, але рідкісні.

Ризик інфікування існує з моменту ініціації.

20% підлітків інфікуються протягом першого року після початку статевого життя.

50% інфікуються протягом перших трьох років після початку статевого життя.

Приблизно 80% сексуально активних людей будуть інфіковані ВПЛ до 50 років.

Як можна ефективно захиститися від ВПЛ?



- Тільки вакцинопрофілактика захищає від ВПЛ.
- Вакцину можна робити дівчаткам і хлопчикам після 9 років
- Клінічні дослідження, проведені для вакцини проти ВПЛ, яка існує з 2006 року, довели її ефективність та безпечність.
- Вакцина відшкодовується більш ніж 70 країнами і використовується в більш ніж 130 країнах світу.
- Вакцина проти ВПЛ дає тривалий і стійкий імунітет.



źródło: google.com



źródło: google.com

Профілактика інфікування ВПЛ

Вакцина проти ВПЛ
вводиться за двома схемами.

Схема I: дві дози

внутрішньом'язово
з інтервалом від 5 до 13 місяців;

Схема II: три дози,

друга ін'єкція через 2 місяці

після першої дози, третя ін'єкція

через 6 місяців після першої.


Факти та статистика

2006 - Реєстрація першої квадривалентної вакцини проти ВПЛ. 2008 - Присудження Нобелівської премії Харальду цур Хаузену за визначення ролі ВПЛ в етіології раку шийки матки.

Країни, які запровадили фінансовані державою програми вакцинації проти ВПЛ: Швеція, Австралія, Нова Зеландія, Австрія, Хорватія, Чехія, Ізраїль, Італія, Сербія, Швейцарія, Німеччина, Англія, Норвегія.

У країнах з універсальними програмами вакцинації проти ВПЛ спостерігалось зниження рівня інфікування ВПЛ на 83% серед дівчат у віці від 13 до 19 років і на 66% серед жінок у віці від 20 до 24 років.

У Швеції спостерігалось зниження захворюваності на 88% серед жінок, вакцинованих до 17 років, і на 53% серед жінок, вакцинованих у віці від 17 до 30 років





Безпека вакцинації проти ВПЛ

7 клінічних досліджень III фази, проведених на більш ніж 29 000 жінок і чоловіків вакцина добре переносилася.

Вакцина була впроваджена в національні програми вакцинації по всьому світу.

Було введено понад 270 мільйонів доз.

Безпека вакцини проти ВПЛ відстежувалася протягом 9 років у більш ніж 15 клінічних дослідженнях за участю понад 1 мільйона дітей, підлітків та дорослих.



źródło: google.com

Безпека вакцинації проти ВПЛ

Не виявлено зв'язку між вакцинацією та виникненням аутоімунних захворювань, синдрому передчасного виснаження яєчників, смерті. Найбільш поширеними побічними реакціями на вакцини проти ВПЛ є місцеві реакції, запаморочення і головний біль, незритомність, нудота, біль і набряк і почервоніння в місці введення.

Зазвичай реакції на вакцинацію легкі проходять спонтанно і не викликають побоювань.



УВАГА!!

Вакцинація проти ВПЛ не звільняє жінок від регулярного цитологічного дослідження.

Тільки вакцинація та регулярні цитологічні дослідження є адекватною профілактикою раку, спричиненого ВПЛ.



ПАМ'ЯТАЙТЕ

Профілактика будь-якого захворювання набагато краще її лікування.



źródło: google.com

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ .

Контакт

 **575 955 101**

 **hpv@cm-silesia.pl**



Вакцинація проводиться Центром медицини та стоматології ТОВ "SILESIA MED Sp. z o.o." в рамках "Програми профілактичних щеплень проти вірусу папіломи людини (ВПЛ) в місті Катовіце", який фінансується містом Катовіце та коштами ЮНІСЕФ.